

MEGADYTES LAEVIGATUS Brullé. — Ouanary; entre le Mana et le Maroni.
MEGADYTES STEINHEILI Sharp. — Mana et massif de l'Acarouani.

Gyrinidae.

GYRITES SPECULIGER Rég. — Venezuela : Apure et Rio Nula.

GYRITES SERICEUS Laboulb. — Venezuela : Arauca.

Gyrites Geayi nov. sp. — Long. 4,5-5 millimètres.

Ovalis, parum elongatus, convexus, supra fusco-castaneus, angustissime flavo marginalatus, infra rufo-ferrugineus, pectore utrinque late fusco; prothoracis margine punctato-tomentoso sat angusto, antice latiore; elytrorum margine tomentoso angusto, secundum truncaturam haud latiore et suturam vix ante angulum internum attingente. — ♂ nitidissimus, omnino laevis, tibiis anterioribus sat late triangularibus, tarsis sat late ovatis. — ♀ plus minus late postice reticulata et subopaca, ad basin et scutellum nitidissima.

Très voisin de *G. pygmaeus* Rég., dont il a la taille, la forme et les caractères généraux, il s'en distingue surtout par sa couleur d'un marron foncé à peine irisé sur les élytres, par la bordure tomenteuse un peu moins étroite et par la réticulation de la femelle qui tantôt n'existe qu'au voisinage du sommet, tantôt occupe presque toute l'étendue de l'élytre, moins la base et la région scutello-suturale. — Guyane : rivière Lunier et Haut Carsevenne.

GYRETES PYGMAEUS Rég. — Guyane : montagne de Montsinéry.

GYRETES SCAPHIDIFORMIS Rég., var. — Long. 6-7 millimètres. — Diffère du type par la taille plus grande et un peu plus d'ampleur en arrière de la bordure tomenteuse des élytres. — Vénézuéla septentrional : Anauco, affluent du Guayra.

Hydrophilidae.

STETHOXUS ATER Fab. (*ensifer* Brullé, *ovalis* Brullé, *brasiliensis* Cast.) — Cayenne et massif de l'Acarouani, entre le Mana et le Maroni.

TROPISTERNUS OVALIS Cast. — Mana.

DESCRIPTION DE DEUX PTINIDES ET D'UN NOTOXUS
FAISANT PARTIE DES COLLECTIONS DU MUSÉUM DE PARIS,

PAR M. MAURICE PIC.

PTINUS MULTIMACULATUS nov. sp.

Brevis et latus, nigro piceus, pilis fulvis hirsutus, thorace ad basin et latera-liter elytrisque, 12 maculatis (maculis albidis 4,4,4, oblique dispositis); antennis robustis, nigris; pedibus sat gracilibus, rufescentibus. — Madagascar.

Court et large, noir de poix, seulement un peu brillant sur les élytres orné de poils fauves en partie redressés et longs, avec deux macules basales sur le prothorax et douze macules blanches sur les élytres, six sur chacun. Tête moyenne, ornée d'une macule de pubescence blanche sur le front; antennes foncées, robustes, légèrement revêtues de pubescence grise à la base; prothorax court et large, faiblement élargi sur les côtés médians, un peu étranglé en dessous du milieu et élargi ensuite, gibbeux en dessus sur le milieu du disque, granuleux, orné, de chaque côté de la base, d'une macule blanche; écusson foncé; élytres courts et larges, à épaules marquées mais subarrondies, obliquement diminués en arrière, subtronqués et subexplanés au sommet, déprimés sur le milieu antérieurement, fortement ponctués en lignes (avec les intervalles étroits) au milieu ou vers l'extrémité, mais à ponctuation serrée à la base; chacun de ces organes est orné de six macules blanches espacées et disposées deux à deux, un peu obliquement et à peu près en ligne longitudinale, les internes au-dessus des externes; pattes roussâtres, grêles, un peu pubescentes de gris. Long., 2 millimètres environ.

Région de l'Androy : Ambovombe (D^r J. Decorse, 1901).

Cette espèce, très particulière par sa sculpture et son dessin, est des plus faciles à reconnaître entre toutes les espèces déjà connues de cette région; on peut la placer dans le voisinage de *Emmerezzi Pic*.

PTINUS DECORSEI nov. sp.

Sat elongatus, brevissime pubescens, niger, elytris subcœruleis, thorace in disco elytrisque albolineatis; antennis robustis, longis ad basin pube albida vestitis, apice nigris; pedibus nigris, albido pubescentibus. — Madagasear.

Assez allongé, noir avec les élytres bleutés, seulement un peu brillant sur ces organes, orné d'une double pubescence courte, l'une faite de poils écailleux blanchâtres et couchés, l'autre faite de poils obscurs soulevés; des dessins blancs sur le prothorax et les élytres, ceux-ci allongés. Tête longue; antennes foncées atteignant le milieu des élytres, assez fortes et ornées d'une pubescence blanchâtre à la base, un peu épaissies au sommet avec les derniers articles dépourvus de pubescence blanche; prothorax assez long, modérément élargi en avant, rétréci à la base, orné d'un sillon bordé, de chaque côté, d'une ligne blanche se rejoignant en arrière et cessant en avant du milieu de cet organe; muni sur les côtés d'un faisceau de poils noirs, en forme de dent; écusson petit, pubescent de blanc; élytres assez larges et relativement longs, subparallèles, courtement atténués et subarrondis au sommet, assez fortement striés-ponctués avec les intervalles droits, doublement pubescents, ainsi qu'il est dit plus haut, et ornés sur le disque de dessins blancs disposés longitudinalement, ceux-ci ayant la forme de traits allongés, avec des traces de petites macules en

dessous de l'écusson et sur les côtés en dessous du milieu, sommet irrégulièrement marqué de la même pubescence écailleuse blanche; pattes foncées, moyennes, assez densément revêtues de pubescence blanchâtre, tarsi un peu roussâtres. Long., 3 millimètres environ.

Région d'Ambovombe, plaine d'Etsaramonto (D^r J. Decorse, 1901).

Encore une espèce des plus distinctes; à placer près de *metallicus* Pic et très différent de cette espèce, en plus des dessins, par sa forme plus robuste, le prothorax paraissant denticulé sur les côtés, par suite de la présence d'un faisceau pileux dentiforme fait de poils raides et foncés.

Dédié au D^r J. Decorse, à qui l'on doit de nombreuses et intéressantes découvertes dans notre riche colonie de Madagascar.

NOTOXUS PERUVIANUS NOV. SP.

Elongatus, fere *opacus*, *testaceus*, *immaculatus*, *pube murina vestitus* et *pilis pallidis hirsutus*. — *America meridionalis*.

Allongé, presque mat, entièrement testacé, sauf les yeux noirs, sans taches, orné d'une pubescence grise un peu soyeuse et en plus de poils clairs dressés, finement et densément ponctué. Tête déprimée sur le front; antennes testacées, assez robustes, dépassant la base du prothorax; prothorax subglobuleux antérieurement, courtement étranglé à la base, corne assez large et longue, faiblement dentelée sur les côtés; élytres plus larges que le prothorax, très longs, subparallèles, atténués en arrière et subarrondis au sommet; dessous du corps de la coloration du dessus; pattes testacées. Long., 4 millimètres.

Pérou : Cusco (Gay).

Cette espèce, par sa forme allongée, sa ponctuation fine et dense, devra prendre place près de *bicolor* Say; elle est très distincte par sa coloration jointe à son aspect presque mat, par suite de sa ponctuation fine et de la pubescence assez dense qui la recouvre.

DIAGNOSES PRÉLIMINAIRES DE VINGT-HUIT ESPÈCES NOUVELLES
DE STOMATOPODES ET DÉCAPODES MACROURES DE LA MER ROUGE,

PAR M. LE D^r G. NOBILI.

(MUSÉE D'ANATOMIE COMPARÉE, TURIN.)

Les descriptions étendues et les figures des vingt-huit espèces décrites dans cette note préliminaire paraîtront dans un travail d'ensemble sur la carcinologie de la mer Rouge, que M. le Professeur Edmond Perrier a bien voulu admettre dans les *Annales des Sciences naturelles*.